

営農技術情報

発行 令和3年6月15日

第9号

たいせつ農業協同組合

営農部 農産販売課

本所 営農センター 57-2357

支所 営農センター 87-4111

◆水田雑草の管理について


初中期一発剤で処理しきれず雑草が残ってしまった場合は、中後期除草剤を取り入れた体系防除への切り替えも検討しましょう。



薬剤名	使用時期	散布適期	成分数	使用量(10a)	使用回数	主な適用雑草
クリンチャーEW	移植後20日～ 収穫30日前まで	ノビエ6葉期まで	1	100ml	2	ノビエ
クリンチャーバスME液剤	移植後15日～ 収穫50日前まで	ノビエ5葉期まで ホタルイ発生盛期～増殖中期まで	2	1,000ml	2	ノビエ ホタルイ
バサグラン粒剤	移植後15日～55日 収穫60日前まで	ホタルイ発生盛期～増殖中期まで オモダカ発生盛期～発生揃期まで	1	3～4 kg	1	ホタルイ オモダカ
アトトリ豆つぶ250	移植後20日～ 収穫45日前まで	シズイ草丈30cm以下 オモダカ発生盛期～矢尻葉3葉期まで	1	250g	1	シズイ オモダカ

◆分けつから幼穂形成期までの水管理

分けつは日較差(一日のうちの最高気温と最低気温の差)が大きければ大きいほど発生します。日中は浅水管理を実施し水温の確保に努め、分けつを促進しましょう。「早朝かん水・日中止水」を基本とし、風の強い日や低温時には深水管理をしましょう。



好天の日は浅水(2～3cm)、低温・荒天時は深水(7～10cm)で管理する
好天時は浅水(3～4cm)とし、分けつ発生を促進する

◆土壌還元(ワキ)への対策

ワキの激しい水田では晴天日を選んで中干しと併せて溝きりを行いましょう。また、土壌還元(ワキ)対策で中干しを行う場合はほ場に亀裂を生じさせないように注意し、幼穂形成期までに終わらせましょう。

ワキの程度	症状	生育への影響	対策
中	水田に足を踏み込むと気泡の発生が多い	根の活力低下	水の入れ換え 暗きょ水こうの開放
多	水田に足を踏み込むと盛んに気泡が発生する	根張り不良	一時落水 暗きょ水こうの開放
甚	晴天時、自然に気泡を発生し音が聞こえる	根の伸長阻害 地上部の黄化	3～5日軽い亀裂が入る中干し

～農産物出荷契約書類、生産資材各種とりまとめ書類等ご提出のお礼～

生産者の皆様には農作業で大変お疲れのところ、農産物出荷契約書類等のご記入およびご提出、あるいは職員訪問へのご対応誠にありがとうございました。

また、緊急事態宣言により農事組合長会議が開催できず、内容について十分なお説明ができていない中にも拘わらず、JAの趣意にご理解賜り多くの契約数量をご契約頂きましたことを重ねて心からお礼申し上げます。

コロナ禍での農産物の需給情勢はとても厳しい状況ですが、この契約数量をもとに少しでも有利販売につなげ、還元できるよう努力してまいります。