

畑作技術情報

発行 令和7年4月11日
第2号
たいせつ農業協同組合
営農部 農産販売課
上川農業改良普及センター
本所 営農センター 57-2357
支所 営農センター 87-4111

春まき小麦のは種について

1 は種時期

ほ場の排水、乾燥を促進させ、は種条件を整えて早期には種しましょう。

は種が遅れると、千粒重が軽くなり歩留まりが低下し、減収します

(は種が10日遅れる毎に70kg/10a 減収※図参照)。

2 は種量

R6年産の「春よ恋」種子の千粒重は37.4gです。従って、は種量は12.7kg/10a(340粒/m²)となります。

例年より千粒重が軽いので、例年とおりの目盛りでは種すると、は種量が多くなり倒伏を助長し減収につながります。

適正なは種量となるよう、必ずは種機を調整してください。

また、は種の際は、試験走行し、は種状況(は種深度(2~3cm程度)、は種量)の確認を行ってください。




図 は種期と子実重(上川農試 1999~2001年)

3 施肥量(基肥)(北海道施肥ガイド2020より)

土 壌 区 分	施肥量(kg/10a)				施肥例 肥料名	施肥量 (kg/10a)	施肥量(kg/10a)			
	窒素	リン酸	カリ	苦土			窒素	リン酸	カリ	苦土
低地土	8.0	12.0	8.0～ 9.0	3.0～ 4.0	BB532 または BB082	50 80	7.5 8.0	11.5 14.4	6.0 9.6	2.5 4.0
泥炭土	6.0	14.0 ～ 15.0			BB082	60	6.0	10.8	7.2	3.0
火山性 土	9.0				BB532 または	60	9.0	13.8	7.2	3.0
台地土	9.0				BB082	90	9.0	16.2	10.8	4.5

4 除草剤の散布

除草剤名	使用時期	使用量(10a)	備考
ガルシアフロアブル	小麦の1~3葉期 (雑草発生始期)	200ml	・砂土での使用しないこと。 ・激しい降雨が予想される場合は使用を避ける。 ・イヌカミツレが多発するほ場では効果が高い。
キタシーブフロアブル	は種後~小麦3葉期 (雑草発生前~発生始期)	80~100ml	・砂土系では使用しないこと。 ・激しい降雨が予想される場合は使用を避ける。 ・水稻、大麦、ソルガムに薬害が生じる恐れがあるため、散布した当年または翌年の栽培を避ける。

※いずれの薬剤も使用回数は1回です！

農作業が始まります！トラクターの横転や転落事故に注意しましょう！