

令和7年5月29日

畑作生産者各位

営農部農産販売課

畑作技術情報訂正のお知らせとお詫び

向暑の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

また、日頃より農協事業に対し特段のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、先日ご案内申し上げた畑作技術情報（第4号）の内容に誤りが御座いました。

謹んでお詫び申し上げるとともに、下記の通り訂正させていただきます。

記

【誤】

ベフトップジン FL は **R8年10月より使用不可**になります。

表1 赤かび病参考防除歴						
	生育ステージ	薬剤名	系統名	病害・希釈倍率	10a 当り 薬量	回数
				赤かび病		
1回目	開花始め	シルバキュア FL	DMI	2,000	50ml	2
2回目	前回から7日後	ミラビス FL	SDHI	1,500	66ml	2
		ベフトップジン FL	MBC ・ グアジッ	1,000	100ml	1
3回目※	前回から7日後	シルバキュア FL	DMI	2,000	50ml	2

※3回目の防除は春まき小麦の方は実施しましょう。（秋まき小麦は2回目まで）
※ベフトップジン FL は R8年10月より使用不可になります。在庫管理にはお気を付けください。



【正】

ベフトップジン FL は **R7年11月より使用不可**になります。

表1 赤かび病参考防除歴						
	生育ステージ	薬剤名	系統名	病害・希釈倍率	10a 当り 薬量	回数
				赤かび病		
1回目	開花始め	シルバキュア FL	DMI	2,000	50ml	2
2回目	前回から7日後	ミラビス FL	SDHI	1,500	66ml	2
		ベフトップジン FL	MBC ・ グアジッ	1,000	100ml	1
3回目※	前回から7日後	シルバキュア FL	DMI	2,000	50ml	2

※3回目の防除は春まき小麦の方は実施しましょう。（秋まき小麦は2回目まで）
※ベフトップジン FL は R7年11月より使用不可になります。在庫管理にはお気を付けください。